VIH/SIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS

- Hasta diciembre del año 2000 se reportaron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 774,467 casos de SIDA. De esos casos:

  El **82 por ciento** se dio en hombres
  El **17 por ciento** se dio en mujeres
  El **1 por ciento** se dio en niños menores de 13 años de edad. [1]

- El cuarenta y tres por ciento de los 774,467 casos de SIDA se dio entre gente blanca: el 38 por ciento entre negros; el 18 por ciento entre hispanos; y menos del **1 por ciento**, cada uno, entre asiaticos americanos/isleños del Pacifico e indígenas amaricanos/nativos de Alaska.[1]

- Aproximadamente un **82 por ciento** de los adultos y adolescentes hispanos reportados con SIDA en los Estados Unidos hasta diciembre del año 2000, fueron hombres.[1]

- En el año 2000, los hombres de color representaron el **47 por ciento** de los casos de SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En comparación, en 1989, los hombres de color representaban solamente el **31 por ciento** de los casos de SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.[2]

- Los 10 Estados o Territorios que reportaron cumulativamente las cifras mas elevadas de casos de SIDA entre sus residentes, son los siguientes: Nueva York, California, Florida, Tejas, Nueva Jersey, Illinois, Puerto Rico, Pensilvana, Georgia, y Maryland.[1]

- Hasta diciembre del año 2000, en áreas con reporte confidencial de VIH, se reportaron 127,286 personas viviendo con VIH diagnosticado (no SIDA); en el año 2000, se reportaron 21,704 casos de VIH provenientes de estas áreas.[1]

- Las mujeres representaron el **32 por ciento** de los casos de VIH (no SIDA) reportados en el año 2000, de las áreas con reporte confidencial de VIH. Entre ellas, las de raza negra y las hispanas representaron el **77 por ciento** de los casos. Entre los hombres con VIH (no SIDA) durante el mismo periodo de tiempo, los de raza negra y los hispanos representaron el **58 por ciento** de los casos de VIH.[1]

- En las áreas con reporte confidencial de VIH, las personas de 13 a 24 años de edad, representaron el **16 por ciento** de los casos nuevos de VIH (no SIDA) reportados en el año 2000. Entre estas personas, la mujeres representaron el **47 por ciento** de los casos en este grupo de edad.[1]

- Las mujeres en todos los grupos raciales/étnicos citan el contacto heterosexual o el consumo de drogas inyectadas como sus modos principales de exposición al VIH, mientras que las asiáticas-americanas/isleñas del Pacifico, citan con mayor frecuencia el contacto heterosexual.[1]

- Más de un **50 por ciento** de los 40,000 casos nuevos de contagio por VIH, calculados anualmente, ocurren entre afro estadounidense.

Para más información sobre el VIH/SIDA en los Estados Unidos, sírvase contactar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades al 1-800-458-5231, o en el Internet: www.cdcnpin.org

Los términos "Afro Americano" y "Negro" se usan de manera intercambiable para incluir a aquellos individuos que se identifican a si mismos como tales. El término "Hispano" incluye a aquellos individuos que ser identifican a si mismos como "Latino/a" o "Hispano/a".

[1] Centers for Disease Control and Prevention, *HIV/AIDS Surveillance Report, 2000;* Vol. 12 (No. 2).
[2] Centers for Disease Control and Prevention, HIV/AIDS Among Racial/Ethnic Minority Men Who Have Sex with Men — United States, 1989-1998, *Morbidity and Mortality Weekly Report*, January 14, 2000/49 (01); 4-11.

La Campaña de Liderazgo contra el SIDA es un programa de la Oficina de Políticas del VIH/SIDA del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos - (202) 690-5560

The Leadership Campaign on AIDS is a program of the Office of HIV/AIDS Policy - (202) 690-5560 – www.hhs.gov
Note: The models shown are for illustrative purposes only.